

# BORO MAX 11



## IL BORO NELLA SUA MASSIMA EFFICACIA

- // RISOLVE LE CARENZE DI BORO
- // FAVORISCE L'IMPOLLINAZIONE
- // MIGLIORA L'ALLEGAGIONE

Boro Max 11 è un formulato liquido ad altissima concentrazione di Boro **complessato con etanolammina**, una molecola organica che funge da "vettore", riduce le perdite per lisciviazione e aumenta la penetrazione cuticolare.

A differenza dei tradizionali fertilizzanti a base di boro, Boro Max 11 **viene assorbito rapidamente** dalle foglie e dalle radici, garantendo una traslocazione immediata all'interno della pianta verso i tessuti in crescita (fiori, germogli, frutti) consentendo di **prevenire e curare efficacemente le carenze di Boro**.

### IMPOLLINAZIONE E ALLEGAGIONE

Il boro è un **microelemento fondamentale per la fertilità fiorale**, ma la sua mobilità all'interno della pianta è limitata, e senza adeguate quantità di boro, si riscontrano ridotta allegagione, cascola dei frutti e cali produttivi.

L'impiego di Boro Max 11 in **pre-fioritura** consente di predisporre la pianta ad una corretta fecondazione, garantendo così un'ottimale allegagione.

La sua azione infatti **favorisce l'allungamento del tubetto pollinico, stimola la germinazione del polline e ne aumenta la vitalità** (supportando i processi metabolici legati alla divisione cellulare e alla sintesi degli acidi nucleici), **facilita il trasporto dei carboidrati verso i fiori e le giovani gemme** (fornendo l'energia necessaria per lo sviluppo riproduttivo) e infine **aiuta a formare e stabilizzare le pareti cellulari** dei delicati organi fiorali.

PER UNA  
ALLEGAGIONE  
AL TOP

IN PRE-FIORITURA  
**BORO MAX 11**  
+  
**GROW PLANT T1**

IN PIENA FIORITURA  
**PRONUBEX BIO**  
+  
**STYMUS**

#### REGISTRAZIONE

CONCIME A BASE MICROELEMENTI  
Boro etanolammina

#### COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua | 11%

#### FORMULAZIONE / PROPRIETÀ

Liquido solubile in acqua  
pH (1% in soluzione) 7,8  
Densità 1,375 (kg/L a 20°C)  
Colore trasparente

#### DOSAGGIO

##### APPLICAZIONE FOGLIARE

**Olivo:** 150-250 g/hl in pre fioritura, in fioritura e post allegagione

**Alberi da frutta (vite, kiwi, agrumi, drupacee, pomacee):**

150-250 g/hl all'inizio della fioritura e alla caduta dei petali;  
250 g/hl dopo il raccolto, prima dell'invecchiamento delle foglie

**Orticole in pieno campo:** 150-250 g/hl.

**Orticole sotto serra:** 100-150 g/hl.

##### APPLICAZIONE RADICALE

5-7 Kg/Ha utilizzando sufficiente acqua