



PRONUBEX BIO



BioPlant®



TAGLIE DISPONIBILI

Flacone 250 ml, 1 L

Tanica 5 L, 25 kg

BIOPROMOTORE DELL'ALLEGAGIONE PIÙ FRUTTI DA ORTICOLE, FRUTTICOLE, AGRUMI, OLIVO.

Pronubex Bio è un **biopromotore naturale dell'allegagione** ottenuto da una sapiente combinazione di estratti di alghe brune, polisaccaridi, amminoacidi, microelementi ed altri costituenti naturali.

Un concime specifico e completo, che grazie all'azione veicolante della componente amminoacidica, viene assorbito in modo rapido ed efficace, garantendo una **maggiore ed uniforme allegagione anche in condizioni ambientali sfavorevoli**, con conseguente incremento delle produzioni.

Tra i suoi componenti infatti spiccano, tra le altre, la presenza di **PROLINA** (amminoacido osmoprotettivo con azione antistress), **PROPOLI** (vero e proprio antibiotico naturale con proprietà antibatteriche, disinfettanti e immunostimolanti), **BORO** (che favorisce la sintesi di zuccheri e proteine e la germinazione del polline), e **ZINCO** (che riduce l'aborto dei fiori e la perdita dei frutti).

Il suo impiego **diminuisce gli aborti fiorali, incoraggia l'attività pronuba degli insetti impollinatori**, crea **grappoli più allungati** e uniformi, aumenta la capacità di **resistenza dei frutticini agli stress** (che portano spesso ad una cascola anticipata) e, nella vite, riduce il fenomeno dell'acinellatura.

La sua applicazione su frutticole è consigliata per **un trattamento in piena fioritura** o, per un'azione più completa, per **due trattamenti, uno all'inizio ed uno alla fine della fioritura**.

Per le **orticole da frutto** è consigliato un trattamento ad ogni palco fiorale.

PER UNA
ALLEGAGIONE
AL TOP

IN PRE-FIORITURA
BORO MAX 11
+
GROW PLANT T1

IN PIENA FIORITURA
PRONUBEX BIO
+
STYMUS

REGISTRAZIONE

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune con microelementi
N 1 + 10,5 C

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	1,0%
Boro (B), solubile in acqua	0,2%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,15%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,15%
Carbonio (C) organico	10,5%
Sostanza organica con peso molecolare < 50 kDa	39,0%
pH	5,7%

DOSAGGIO

APPLICAZIONE FOGLIARE

Frutticole: - 2 applicazioni a 250 g/hl al 30% di fiori aperti e 70% di fiori aperti
oppure: - 1 applicazione a 300 g/hl a metà fioritura

Orticole da frutto: 250 g/hl ad inizio fioritura di ogni palco fiorale

FORMULAZIONE / PROPRIETÀ

Liquido solubile
pH (1% in soluzione) 5,7
Densità (g/ml, 20°C) 1,16
Colore Marrone scuro

AVVERTENZE

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

Conservare a temperatura compresa tra 5° C e 32° C.

